

Vier neue europäische Coleopteren-Arten aus der Familie der Corylophidae.

Von Rev. A. Matthews in Gumley, England.

1. *Sacium Marseulii* n. sp.

L. c. 1 mm. *Late ovale, valde convexum, nitidum, pallide castaneum, sat profunde punctatum, pilis fluorescentibus parce vestitum; pronoto magno, antice ovaliter rotundato, reflexo; et pellucido, modice punctato interstitiis nitidis, margine basali fere recta angulis acutis; elytris brevibus, pronoto sesqui longioribus, haud latioribus, ad humeros latissimis, punctis umbilicatis confertim impressis, interstitiis leviter alutaceis, stria suturali profunda, apicibus vix rotundatis: pygidio castaneo; pedibus atque antennis modicis, laete flavis, harum articulo septimo minime incrassato.*

Habitat: Galliam; in Mus. Dom. S. A. de Marseul.

2. *Sericoderus brevicornis* n. sp.

L. c. 1·12 mm. *Obconicus, modice convexus, nitidissimus, flavus, pilis aureis vestitus; pronoto permagno, lato, antice circulariter rotundato, haud reflexo, indistincte punctato, margine basali vix sinuata angulis longe productis; elytris postice attenuatis, pronoto haud latioribus plus quam sesqui longioribus, ad humeros latissimis, leviter et confertissime asperatis, stria suturali profunda, abdomine rufo-ferrugineo; antennis perbrevis, atque pedibus robustis laete flavis.*

Habitat: Europam? Exemplum unicum, notatione nulla addita, in Mus. Jekel repertum.

3. *Corylophus Reitteri* n. sp.

L. c. 0·75 mm. *Subhemisphericus, fere ovatus, nitidissimus, laete castaneus elytrorum lateribus infuscatis; pronoto sat magno, antice circulariter rotundato, minute alutaceo, margine anteriori haud reflexo, margine basali leviter sinuata angulis acutis, parum productis; elytris pronoto parum latioribus, plus quam sesqui longioribus, prope mediam latissimis, alutaceis, minute et remote punctatis; pedibus atque antennis laete flavis. Differt a *C. sublaevipenni* statura minori, forma magis convexa, atque antennarum articulo septimo valde amplificato, et octavo minuto.*

Habitat: Europam; in Corfu lectus, in Mus. E. Reitter.

4. *Rhypobius obtusus* n. sp.

L. c. 0·75 mm. *Subhemisphericus, nitidissimus, rufocastaneus, pronoto alutaceo, elytris profunde umbilicatum punctatis; pronoto*

sat magno, alutaceo, nitidissimo, lateribus circulariter rotundatis margine basali scutellum versus valde producta angulis acutis; elytris brevibus, valde rotundatis capite atque pronoto longioribus, haud latioribus, ad mediam latissimis, punctis magnis umbilicatis profunde impressis, interstitiis alutaceis, nitidis, lateribus valde rotundatis; pedibus robustis, flavis; antennis modicis, laete flavis, articulo septimo magno, longo.

Differt a Rh. ruficolle forma brevi rotundata atque sculptura valde dissimili.

Habitat: Europam; in Sicilia prope Palermo lectus.

Eine neue behaarte Meloë-Art aus Turkestan.

Von Edm. Reitter in Mödling.

Meloë griseopuberulus n. sp.

Schwarz, fast matt, mit schwachem Bleiglanz, oben abgeflacht, überall kurz, fein und gleichmässig greis behaart. Fühler schlank. Kopf etwas breiter als der Halsschild, ziemlich quadratisch, herabgebogen, dicht und stark punktirt, der Scheitel mit einer Längsrinne, die Schläfen, von oben gesehen, fast rechteckig, die Oberlippe und der Clypeusrand viel länger greis behaart. Halsschild quer, die Seiten parallel, die Vorderwinkel ganz verrundet, der Hinterrand ausgeschnitten, der Vorderrand gerade abgestutzt, die Scheibe nicht gewölbt, wenig gedrängt, aber stark punktirt, mit kurzer, hinten breitfurchenartiger Mittellinie, die Scheibe vorn jederseits mit tiefer Grube. Flügeldecken gerunzelt und fein punktirt, sehr kurz greis behaart, abgeflacht, ähnlich wie bei *decorus* und *Reitteri*. Abdomen deutlicher punktirt und etwas länger und mehr gelblich behaart. Unterseite glänzend, Bauch stark gerunzelt. Mittelschienen etwas gebogen, die Tarsen unten länger behaart. Länge 7 mm.

Eine kleine flache Art, aus der Verwandtschaft des *M. nanus* Luc. und *pubifer* Heyden; unterscheidet sich von dem ersteren durch abgeflachte, breitere Körperform, starke Punktur des Kopfes und Halsschildes und die deutlichere greise Behaarung; von dem letzteren durch abgeflachten Körper, starke Punktur des Kopfes und Halsschildes, feinere greise Behaarung und deutliche Runzelung der Flügeldecken und des Abdomens, endlich viel grössere und mehr vorspringende Augen.

Turkestan. In meiner Sammlung.